ประจำปี 2570

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง



กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รวบรวมจัดทำ

คำนำ

กรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลควนเนียง ประจำปี 2570 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและปรับปรุงรายการยาที่มีใช้และสามารถสั่งใช้ในโรงพยาบาลควนเนียง และเป็นคู่มือการบริหารและการใช้ยาของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการปรับปรุงแก้ไขปีละ1-2ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและข้อมูลยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับระบบการส่งต่อของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ตุลาคม 2569

(นายนัชชา ทัตตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
รายการบัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชีย่อยของบัญชียาหลักแห่งชาติ	ก
คำอธิบายรายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข และคำจำกัดความรูปแบบยาที่สำคัญ	ค
รายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร	ง
รายการยาแผนปัจจุบันในบัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง	1
รายการยาสมุนไพรในบัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง	32

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกอบด้วย

๑. บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

๒. บัญชียาจากสมุนไพร

"บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข" หมายความว่า รายการยาแผนปัจจุบันสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ตามภาคผนวก ๑ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีย่อย ๕ บัญชีได้แก่ บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญชี จ รวมทั้งรายการยาเภสัชตำรับโรงพยาบาล ตามภาคผนวก ๒

บัญชี ก หมายความว่า รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง และเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น

บัญชี ข หมายความว่า รายการยาที่ใช้สำหรับข้อบ่งใช้หรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชี ก ตามความจำเป็น

บัญชี ค หมายความว่า รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทางโดยผู้ชำนาญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยสถานพยาบาลจะต้อง

(๑) มีมาตรการกำกับการใช้ยา

(๒) มีความพร้อม ตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจาก

(๒.๑) ถ้าใช้ยากลุ่มนี้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือ

(๒.๒) เป็นยาที่ มีแนวโน้ มใน การใช้ไม่ ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือไม่ คุ้มค่า หรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่จำกัด หรือมีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างจำกัด

บัญชี ง หมายความ ว่า รายการยาที่มี หลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่มีราคาแพง จำเป็นสำหรับ ผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรง การสั่งใช้ยาให้สมเหตุผลคุ้มค่า สมประโยชน์ สถานพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ใช้ยาตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขที่กำหนด

(๒) วินิจฉัยและสั่งใช้ยา โดยผู้ชำนาญเฉพาะโรคที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานฝึกอบรม หรือได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา หรือ ทันตแพทยสภาเท่านั้น สำหรับการสั่งยาในครั้งต่อไป สถานพยาบาลอาจมอบให้แพทย์ผู้ชำนาญรับผิดชอบในการสั่งยาได้ โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ชำนาญเฉพาะโรคดังกล่าว

(๓) มีระบบกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยต้องเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบในอนาคต

บัญชี จ หมายความว่า

บัญชี จ(๑) รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีงบประมาณ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน มีการกำหนดวิธีการใช้และแนวทางในการติดตามประเมินการใช้ยาตามโครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นระยะตามความเหมาะสม และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

โดยมีการคำนวณผลกระทบระยะยาวต่อประเทศในกรณีที่โครงการมีการขยายผล เพื่อพิจารณาจัดเข้าประเภทของบัญชีย่อยอื่นในบัญชียาหลักต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

บัญชี จ(๒) รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในกำกับการใช้ยาภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา ตามภาคผนวก ๓

“รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ” ตามบัญชี จ(๒) หมายความว่า ยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ เป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด สถานพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้

“เภสัชตำรับโรงพยาบาล” หมายความว่า รายการยาที่โรงพยาบาลสามารถผลิตขึ้นใช้ภายใน โรงพยาบาลตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล ที่เป็นรายการยาตามที่ระบุในภาคผนวก ๑ หรือภาคผนวก ๒ หรือตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับปัจจุบัน

“บัญชียาจากสมุนไพร” หมายความว่า รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร ซึ่งมีตัวยาในสูตรตำรับ และรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับปัจจุบัน โดยมีรายการยาจากสมุนไพรที่แนบรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลรวมอยู่แล้ว

คำอธิบายรายการยาในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

รายละเอียดของรายการยาประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา รูปแบบยา บัญชีย่อย นอกจากนี้ อาจมีความแรง ขนาดบรรจุ เงื่อนไข คำเตือนและข้อควรระวัง ข้อกำหนดอื่นๆ และหมายเหตุ

ให้ถือว่ายาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้น เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

การแสดงชื่อสามัญทางยา (generic name) และรูปแบบยา (dosage form)

ส่วนใหญ่ชื่อสามัญทางยาจะแสดงด้วยชื่อ International Nonproprietary Name (INN) หากชื่อ INN นั้นไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จะแสดงด้วยชื่อ INN ตามด้วยชื่ออื่นไว้ในวงเล็บ ในกรณียาชนิดนั้นไม่มีชื่อ INN ให้ใช้ชื่ออื่นแทน เช่น British Approved Name (BAN), United States Adopted Name (USAN) เป็นต้น

ยาทุกรายการ หมายถึงยาที่มีสารออกฤทธิ์ ๑ ชนิดที่มีรูปแบบยาตามที่ระบุไว้เท่านั้น เว้นแต่ยาสูตรผสมจะแสดงชื่อสามัญทางยาของสารออกฤทธิ์ในสูตรยารายการนั้นทั้งหมด

รูปแบบยาที่แสดงในบัญชี หมายถึง รูปแบบยาทั่วไป ที่มิได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่หมายถึงรูปแบบยาที่มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นพิเศษหรือจำเพาะเจาะจงจะระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ โดยระบุรูปแบบยานั้นๆ อย่างชัดเจน ตัวอย่างรูปแบบที่มีการพัฒนารูปแบบยาเป็นพิเศษ เช่น ยาเตรียมสำหรับออกฤทธิ์นานทุกชนิด vaginal tablet, rectal suppository, sublingual tablet, enteric coated tablet, effervescent tablet, orodispersible tablet, microspheres suspension for injection เป็นต้น ตัวอย่างการจำเพาะเจาะจงรูปแบบยาบางชนิด เช่น Ibuprofen film coated tablet หมายถึง ยาเม็ด ibuprofen ชนิดเคลือบฟิล์ม ไม่รวมถึงชนิดเคลือบน้ำตาล ชนิดตอกอัดเม็ดธรรมดา รวมทั้งชนิดออกฤทธิ์นาน เป็นต้น

ในกรณีเป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาลจะระบุอักษร “hosp” ไว้ในวงเล็บท้ายรูปแบบยา เช่น sol (hosp) หมายถึง ยาที่สถานพยาบาลผลิตเองในรูปแบบ solution เป็นต้น

คำจำกัดความรูปแบบยาที่สำคัญ

tab / cap หมายถึง ยาเม็ด หรือแคปซูล แบบ immediate release (IR) สำหรับกินทั่วไป ที่มิได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นการเฉพาะหรือเป็นพิเศษ เช่น compressed tablet, film coated tablet, sugar coated tablet เป็นต้น

SR tab / cap หมายถึง ยาเม็ดหรือแคปซูลสำหรับรับประทานที่เป็นยาออกฤทธิ์นานทุกชนิด เช่น controlled release, extended release, modified release, slow release เป็นต้น

EC tab / cap หมายถึง ยาเม็ดหรือแคปซูล สำหรับรับประทานที่ออกแบบให้ตัวยาละลายในลำไส้ (enteric coated)

dry syrup หมายถึง ผงแห้งของส่วนผสมตัวยาหรือสารเคมี ที่ต้องเติมน้ำกระสายยาที่เหมาะสมก่อนใช้จึงจะได้ยาน้ำเชื่อมตามต้องการ เช่น ยาน้ำแขวนตะกอน สารละลายใส เป็นต้น

syrup หมายถึง ยาน้ำใสหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่มีส่วนประกอบของสารเพิ่มความหวานเพื่อกลบรสขมของยา ตัวอย่างสารให้ความหวานที่ใช้ในตำรับ เช่น sucrose, dextrose นอกจากนี้อาจใช้สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน หรือให้พลังงานต่ำ เช่น saccharin, sorbitol, mannitol และ aspartame เป็นต้น

eye drop หมายถึง ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับหยอดตา

sterile solution หมายถึง ยาปราศจากเชื้อในรูปแบบของสารละลาย สำหรับฉีด หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือ irrigation

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

ประกอบด้วยบัญชีย่อย 3 บัญชี ได้แก่

บัญชีรายการยาพื้นฐาน หมายความถึง รายการยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพสั่งใช้ได้โดยทั่วไป

บัญชีรายการยาเฉพาะ หมายความถึง รายการยาที่ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยและสั่งใช้ยาโดยแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ แพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมหรือผู้อานวยการสถานพยาบาลนั้น ๆ มอบหมาย

บัญชีรายการยาพิเศษ หมายความถึง รายการยาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์จำกัดและต้องมีการติดตามประสิทธิผล ความปลอดภัย เพื่อนามาใช้ทบทวนสถานการณ์การบรรจุรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากที่พิจารณาไว้เดิม ทั้งนี้บัญชีรายการยาพิเศษต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ
2. นำเสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย
   2.1 บทสรุปผู้บริหาร
   2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ รวมทั้งที่มาของการพัฒนาสูตรตารับ (ถ้ามี)
   2.3 มีวัตถุประสงค์
   2.4 วิธีการดาเนินโครงการ
   2.5 กาหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการชัดเจน
   2.6 ต้องมีการระบุ สรรพคุณเฉพาะ (specific health benefits) หรือข้อบ่งใช้ (clinical indication) และกาหนดวิธีใช้ยา ให้ชัดเจน
   2.7 แนวทางการติดตามประเมินผลการใช้ยาทั้งด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยโดยมีการรายงาน ความปลอดภัยไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ในทุกรายที่พบ
   2.8 มีแนวทางการติดตามความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
   2.9 มีหนังสือแสดงความจานงในการรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
3. ให้รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากที่พิจารณาไว้เดิม และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

1.Simeticone (Simethicone) chewable tab, susp	chewable tab, susp	ก
2.Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative)	เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate mixt	ก

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

1.Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
2.Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide)	tab, syr, sterile sol	ก
3.Metoclopramide	sterile sol	ก

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

1.Omeprazole	EC cap (as base)	ก
2.Omeprazole sodium	sterile pwdr	ข

1.4 Drugs used in acute diarrhea

1.Oral rehydration salts (ORS)	oral pwdr, oral pwdr (hosp)	ก

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

1.6 Laxatives

1.Magnesium hydroxide	susp	ก
2.Sodium phosphates	enema	ก
3.Lactulose	syr	ข

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy
2. ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
3. ใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาระบายอื่นไม่ได้
4. ใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ magnesium

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

1.Local anesthetic + Corticosteroid with/without astringent	rectal supp	ข

1.8 Drugs affecting intestinal secretions

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

1.Digoxin	tab, sterile sol	ก

2.2 Diuretics

1.Furosemide	tab, sterile sol	ก
2.Hydrochlorothiazide (HCTZ)	tab	ก
3.Mannitol	sterile sol	ก
4.Spironolactone	tab	ก

2.3 Anti-arrhythmic drugs

1.Adenosine	sterile sol	ก
2.Atropine sulfate	sterile sol	ก
3.Lidocaine hydrochloride (preservative free)	sterile sol (เฉพาะ 1%,2%) /sterile sol (hosp)	ก
4.Magnesium sulfate	sterile sol	ก
5.Amiodarone hydrochloride	sterile sol	ค

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

1.Metoprolol tartrate	immediate release tab	ก
2.Propranolol hydrochloride	tab	ก
3.Carvedilol	tab (6.25 mg , 25 mg Service plan)	ค

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

1.Hydralazine hydrochloride	tab, sterile pwdr	ก

2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

1.Doxazosin mesilate	immediate release tab	ค

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

1.Enalapril maleate	tab	ก
2.Captopril	tab	ก

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

1.Losartan potassium	tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ข

2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

1.Glyceryl trinitrate	sterile sol	ก

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในกรณีที่มี coronary ischemia

2.Isosorbide dinitrate	tab, sublingual tab	ก

2.6.2 Calcium-channel blockers

ยากลุ่มนี้ชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release) ไม่แนะนำให้ใช้รักษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive urgency และ angina pectoris เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า

1.Amlodipine besilate	tab	ก
2.Manidipine	tab	ก
3.Nicardipine Hydrochloride	Sterile sol.	ค
4.Nifedipine	SR cap/SR tab (เฉพาะ 20 mg)	ง

2.6.3 Other vasodilators

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

1.Dopamine hydrochloride	sterile sol	ก

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

1.Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ก

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

1.Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก

2.8 Anticoagulants

1.Warfarin sodium	tab	ค
2.Enoxaparin sodium	sterile sol	ค
3.Heparin sodium	sterile sol	ค

2.9 Antiplatelet drugs

1.Aspirin (Acetylsalicylic acid)	tab,EC tab (เฉพาะ 75-325 mg)	ก
2.Clopidogrel bisulfate	tab	ค

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้aspirin ไม่ได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention)
2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events
4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome (NSTE ACS) ให้ใช้clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ

ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว

3.Ticagrelor	tab (เฉพาะ 90 mg)	ง

เงื่อนไข

ใช้ ticagrelor ร่วมกับ aspirin ขนาด 75-100 มก. โดยให้ใช้ ticagrelor เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ในผู้ป่วย high-risk acute coronary syndrome (ACS) ที่รักษาด้วยวิธี Percutaneous Coronary Intervention (PCI) และเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ป่วย ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) ที่ได้รับการทำ Primary PCI
2. ผู้ป่วย NSTE-ACS ที่มี Grace risk score มากกว่า 140
3. ผู้ป่วยที่แพ้หรือไม่ตอบสนองต่อ clopidogrel เช่น เกิด ACS หรือ stent thrombosis ในขณะที่ได้รับยา aspirin ร่วมกับ clopidogrel

2.10 Fibrinolytic drugs

1.Streptokinase	sterile pwdr	ก

2.11 Hemostatics

1.Tranexamic acid	sterile sol	ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

ใช้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรง การให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิผลในการลด อัตราการเสียชีวิต แต่การให้ยาหลังจาก 3 ชั่วโมงอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออก

หมายเหตุ

การใช้ tranexamic acid ไม่สามารถทดแทนการรักษาที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เช่น การให้เลือด เป็นต้น

2.12 Lipid-regulating drugs

1.Gemfibrozil	tab (เฉพาะ 600 mg)	ก
2.Simvastatin tab	20 mg , 10 mg (ARV)	ก
3.Atorvastatin	tab (เฉพาะ 40 mg) (ARV),Service plan	ข

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

กลุ่มยา 3 Respiratory system

3.1 Bronchodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

1.Salbutamol sulfate	tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer	ก
2.Terbutaline sulfate	sterile sol	ก

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

1.Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide	MDI, sol for nebulizer	ก
2.vilanterol trifenatate + umeclidinium bromide	DPI	ค

3.1.3 Theophylline

1.Theophylline	SR cap, SR tab	ก

3.2 Corticosteroids

1.Budesonide	MDI,susp for nebulizer	ก
2.Budesonide + Formoterol	DPI	ค

หมายเหตุ

1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น
2. การใช้ long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด

3.Fluticasone propionate + Salmeterol	MDI ,DPI	ค
4.Fluticasone propionate	MDI	ก

เงื่อนไข

ใช้เป็นยาทางเลือกกรณีต้องการใช้ยาที่มี potency สูงในการรักษา

3.3 Leukotriene receptor antagonists

1.Montelukast sodium	film coated tab (เฉพาะ 10 mg)	ค

3.4 Antihistamines

ไม่ควรใช้ antihistamines เป็นประจำ(routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)

1.Chlorpheniramine maleate (Chlorphenamine maleate)	tab, syr, sterile sol	ก
2.Hydroxyzine hydrochloride	tab	ก
3.Loratadine	tab	ก

3.5 Pulmonary surfactants

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

3.6 Cough preparations

3.6.1 Cough suppressants

1.Dextromethorphan hydrobromide	tab	ก

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

1.Glyceryl guaiacolate	syr	ก

3.7 Systemic nasal decongestants

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

3.8 Other respiratory preparations

1.Aromatic Ammonia Spirit	spirit , spirit (hosp)	ก

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

1.Diazepam	cap, tab, sterile sol	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
2.Lorazepam	tab	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
3.Clonazepam	tab	ข
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		

3.Dipotassium clorazepate	cap	ข
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
4.Hydroxyzine hydrochloride	tab	ข

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

1. Chlorpromazine hydrochloride	tab, sterile sol	ก
2. Fluphenazine	sterile sol (as decanoate)	ก
3. Haloperidol	tab (as base), sterile sol (as base or decanoate)	ก
4. Perphenazine	tab	ก
5.Trifluoperazine hydrochloride	tab	ก
6. Clozapine	tab	ค
7. Risperidone	tab	ข
8.Thioridazine hydrochloride	tab	ค
9.Quetiapine fumarate	immediate release tab (เฉพาะ 200 mg)	ง

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ schizophrenia ที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถใช้ยา risperidone หรือ clozapine ได้
2. ใช้สำหรับ bipolar disorder ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น

4.2.2 Antimanic drugs

1.Carbamazepine	tab	ก
2.Lithium carbonate	cap	ก
3.Sodium valproate	EC tab	ก

4.3 Antidepressant drugs

1. Fluoxetine hydrochloride	cap,	ก
2. Nortriptyline hydrochloride	tab	ก
3. Sertraline	tab (เฉพาะ 50 mg)	ข
4.Trazodone hydrochloride	tab	ค
5.Mianserin hydrochloride	tab	ข

4.4 Central nervous system stimulants

1. Methylphenidate	tab (เฉพาะ 10 mg)	ค

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
2. ใช้สำหรับ narcolepsy

4.5 Drugs used in nausea and vertigo

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

1. Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
2. Metoclopramide	sterile sol	ก

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

1.Dimenhydrinate	compressed tab,sterile sol	ก

4.6 Analgesics and antipyretic

1. Paracetamol (Acetaminophen)	tab, syr	ก
2. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	compressed tab/film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ส าหรับลดไข้ แก้ปวด เพราะเสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome

หมายเหตุ

Aspirin ชนิด EC tab ดูดซึมได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในข้อบ่งใช้นี้

3. Ibuprofen	film coated tab, susp	ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน
2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก

4.7 Analgesics

4.7.1 Opioid analgesics

1. Fentanyl	transdermal	ค
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
2. Morphine sulfate	oral sol , sterile sol	ค
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
3. Tramadol hydrochloride	cap, sterile sol	ค

4.7.2 Drugs for neuropathic pain

1. Carbamazepine	tab	ก
2. Nortriptyline hydrochloride	tab	ก
3. Gabapentin	cap	ง

เงื่อนไข

ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น

หมายเหตุ

ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

1. Paracetamol (Acetaminophen)	tab	ก
2. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	compressed tab, film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก
3. Ibuprofen	film coated tab	ก
4. Ergotamine tartrate + Caffeine	compressed tab/film coated tab (เฉพาะ 1 + 100 mg)	ค

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

1. Propranolol hydrochloride	tab	ก
2. Cyproheptadine hydrochloride	tab	ข
3. Sodium valproate	EC tab	ง

เงื่อนไข

ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น

4.Topiramate	tab	ง

เงื่อนไข

1. ห้ามใช้เป็นยาตัวแรกในการป้องกันไมเกรน
2. ใช้ในกรณีใช้ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล

4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

1. Carbamazepine	tab	ก
2. Magnesium sulfate	sterile sol	ก
3. Phenobarbital (Phenobarbitone)	tab (as base) ก	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
4. Phenytoin sodium	cap, SR cap	ก
5. Phenytoin base	chewable tab	ก
6. Sodium valproate	EC tab	ก
7. Clonazepam	tab	ข
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		

4.8.2 Drugs used in status epilepticus

1. Diazepam	sterile sol	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
2. Phenytoin sodium	sterile sol	ก
3. Midazolam hydrochloride	sterile sol	ง
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		

4.9 Drugs used in movement disorders

1. Diazepam	tab	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
2. Propranolol hydrochloride	tab	ก
3. Trihexyphenidyl hydrochloride	tab	ก
3. Clonazepam	tab	ข
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		

4.Levodopa + Benserazide as hydrochloride	cap/tab (200+50 mg)	ก

4.10 Drugs used in substance dependence

4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

4.10.2 Drugs used in smoking cessation

1. Nortriptyline hydrochloride	tab	ก

4.10.3 Drugs used in opioid dependence

1.Methadone hydrochloride	oral solution	ง

กลุ่มยา 5 Infections

5.1 Antibacterial drugs

5.1.1 Penicillins

1. Amoxicillin trihydrate	cap, dry syr	ก
2. Ampicillin sodium	sterile pwdr	ก
3. Cloxacillin sodium	sterile pwdr	ก
4. Dicloxacillin sodium	cap	ก
5. Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	tab	ก
6. Benzylpenicillin (Penicillin G)	sterile pwdr (as sodium or potassium)	ก
7. Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	sterile pwdr	ก
8. Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	tab (875/125 mg), dry syr (เฉพาะ 400/57 mg)	ค

5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams

1. Cefalexin (Cephalexin)	dry syr	ก
2. Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	ค

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP)

4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบบางกรณีในผู้ป่วยที่ไตท างานบกพร่องซึ่งไม่สามารถใช้ยากลุ่ม aminoglycosides ได้

5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae

6. ใช้กับผู้ป่วยซิฟิลิสที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งใช้benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได้

3. Ceftazidime	sterile pwdr	ค

เงื่อนไข

ใช้เป็น empiric/specific therapy ส าหรับการติดเชื้อ P. aeruginosa และ melioidosis

5.1.3 Tetracyclines

1. Doxycycline hyclate (Doxycycline hydrochloride)	**cap**	ก

5.1.4 Aminoglycosides

ยา streptomycin sulfate, amikacin sulfate และ kanamycin sulfate ดูที่ Antituberculous drugs

1. Gentamicin sulfate	sterile sol	ก

5.1.5 Macrolides

1. Erythromycin stearate	dry syr	ก
2. Roxithromycin	cap/tab (150 mg)	ก
3. Azithromycin	cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน),dyr syrup	ง

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล

2. ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM)

3. ยา azithromycin ขนาด 2 กรัม กินครั้งเดียว ส าหรับรักษาผู้ป่วย early syphilis ที่ไม่สามารถใช้ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้

5.1.6 Quinolones

1. Norfloxacin	tab	ก
2. Ofloxacin	tab (200 mg)	**ข**
3. Ciprofloxacin hydrochloride	tab	ง
4. Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี ง เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy ดูข้อ 5.1.9 Antituberculous drugs

5.1.7 Some other antibacterials

1. Metronidazole	cap/tab (as base), sterile sol (as base)	ก
2. Clindamycin	cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate)	ข

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียกรัมบวกชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรัมบวก และ anaerobe
2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) ในผู้ป่วยเอดส์
3. ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 และข้อ 2 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด Antibiotics Associated Colitis (AAC)

หมายเหตุ

AAC เกิดได้กับยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทุกชนิดแม้แต่ amoxicillin

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

1. Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole)	tab, susp	ก

5.1.9 Antituberculous drugs

1. Ethambutol hydrochloride	film coated tab	ก
2. Isoniazid	tab	ก
3. Pyrazinamide	tab	ก
4. Rifampicin	cap	ก
5. Streptomycin sulfate	sterile pwdr	ก
6. Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง

เงื่อนไข

ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ยากลุ่ม first-line ได้

5.1.10 Antileprotic drugs

1. Dapsone	tab	ก

5.2 Antifungal drugs

1. Fluconazole	cap	ก
2. Griseofulvin	tab	ก

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

1. Aciclovir (Acyclovir)	tab	ก
2. Oseltamivir phosphate	cap, susp	จ(1)

5.3.2 Antiretrovirals

1. Efavirenz (EFV)	tab	ก
2. Lamivudine (3TC)	tab, syr	ก
3. Nevirapine (NVP)	tab, susp	ก
4. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	tab	ก
5. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine (TDF+FTC)	tab (300 + 200 mg)	ก
6. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine + Efavirenz (TDF +	tab (300 + 200 + 600 mg)	ก
7. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine + DTG (TDF + FTC	tab (300 + 300 + 50 mg)	ก

หมายเหตุ

ยาเม็ดสูตรผสม Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine + Dolutegravir sodium ขนาด 300 + 300 + 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 23.33 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

8. Zidovudine (AZT)	cap, oral sol	ก
9. Zidovudine + Lamivudine (AZT+3TC)	tab (เฉพาะ 300+150 mg)	ก
10. Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine (AZT + 3TC+ NVP)	tab (เฉพาะ 250+150+200 mg)	ก
11.Rilpivirine (RPV)	tab	ข

เงื่อนไข

1. ใช้ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน และต้องมี CD4 > 350 cells/mm 3
2. ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสสูตรอื่นมาก่อน มีระดับ viral load < 50 copies/mL และไม่มีประวัติการดื้อยาต้านไวรัสทุกชนิดมาก่อน สามารถเปลี่ยน PI หรือ NNRTI ที่อยู่ในสูตรยาที่รับประทานอยู่มาเป็น rilpivirine ได้

หมายเหตุ

ใช้เป็นยาใน post exposure prophylaxis ร่วมกับ tenofovir/emtricitabine ได้

12.Atazanavir sulfate (ATV)	cap	ค
13.Dolutegravir (DTG)	tab (เฉพาะ 50 mg)	ค

หมายเหตุ

1. ใช้ยานี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี2563/2564
2. ผู้ป่วยเดิมที่ดื้อยาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนสั่งใช้ยาน
3. ยาเม็ด Dolutegravir ขนาด 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 21.33 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19สิงหาคม 2564 เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

14.Lopinavir + Ritonavir (LPV+RTV)	tab	ค
15.Ritonavir (RTV)	tab	ค
16.Abacavir (ABC)	tab	ค

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้(ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่ส าคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)
2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาต้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปน
   1.1 ไข้
   1.2 ผื่น
   1.3 คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
   1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
   1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ

   ให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

3. ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้ควรมีค่า baseline viral load น้อยกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline viral load มากกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560

17.Sofosbuvir + Velpatasvir	tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg)	จ(2)

เงื่อนไข

ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

5.3.3 Viral hepatitis

1. Lamivudine (3TC)	tab (150 mg)	ง
2. Tenofovir disoproxil fumarate	tab	ง
3.Tenofovir alafenamide (TAF)	tab (เฉพาะ 25 mg)	ง

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1 Antimalarials

1. Chloroquine phosphate	tab	ก

5.4.2 Other antiprotozoal drugs

1. Metronidazole	tab (as base), sterile sol (as base)	ก

5.5 Anthelmintics

1.Albendazole	tab, susp	ก
2.Diethylcarbamazine citrate	tab	ก

5.6 Antiseptics

1. Chlorhexidine gluconate	sol (aqueous) (เฉพาะ 2%, 4% และ 5%), sol/sol (hosp) (เฉพาะ 2%, 4% in 70% alcohol)	ก
2. Ethyl alcohol	sol, sol (hosp), gel (hosp)	ก
3. Povidone-iodine	sol	ก

กลุ่มยา 6 Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

1. Biphasic isophane insulin (Soluble insulin + Isophane insulin)	sterile susp	ก
2. Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin)	sterile susp	ก
3. Soluble insulin (Neutral insulin; insulin injection)	sterile susp	ก

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

1. Glipizide	tab	ก
2. Metformin hydrochloride	tab	ก
3. Pioglitazone hydrochloride	tab (30 mg)	ง

6.1.3 Treatment of hypoglycemia

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

6.2.1 Thyroid hormones

1. Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)	tab	ก

6.2.2 Antithyroid drugs

1. Propylthiouracil	tab	ก

6.3 Corticosteroids

1. Dexamethasone	sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก
2. Hydrocortisone	sterile pwdr (as sodium succinate)	ก
3. Prednisolone	tab	ก
4. Triamcinolone acetonide	sterile susp	ค

6.4 Sex hormones

6.4.1 Female sex hormones

1. Norethisterone	tab	ก
2. Conjugated estrogens	tab	ข
3.Hydroxyprogesterone caproate	sterile oily sol for inj	ข
4.Micronized progesterone	cap (เฉพาะ 100 mg)	ง

6.4.2 Male sex hormones and antagonists

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

6.6 Drugs affecting bone metabolism

1.Alendronate sodium	tab (70 mg)	ง

6.7 Other endocrine drugs

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

1. Methylergometrine maleate	sterile sol	ก
2. Oxytocin	sterile sol	ก

7.1.2 Myometrial relaxants		
1. Terbutaline sulfate	sterile sol	ก
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions		
1. Clotrimazole	vaginal tab	ก
7.3 Contraceptives		
1. Etonogestrel	implant 1 rod (68 mg/rod)	ก
2. Ethinylestradiol + Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg)	ก
3. Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 750 mcg),	ก
	implant 2 rods (75 mg/rod)	ก
4. Medroxyprogesterone acetate	sterile susp	ก
5. Lynestrenol 0.5 mg	tab (เฉพาะ 750 mcg)	ก
7.4 Drugs for genito-urinary disorders		
7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia		
1.Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	ค
2.Doxazosin mesilate	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	ค
3.Finasteride	tab (เฉพาะ 5 mg)	ง
7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence		
**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง		
7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine		
**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง		
กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression		
8.1 Cytotoxic drugs		
8.1.1 Alkylating drugs		
**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง		
8.1.2 Cytotoxic antibiotics		
**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง		

8.1.3 Antimetabolites

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

8.1.5 Other antineoplastic drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

8.2 Drugs affecting the immune response

1.Dexamethasone	sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก
2.Prednisolone	tab	ก

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

8.3.2 Prostate cancer

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

1. Folic acid	tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg)	ก

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

9.2 Fluids and electrolytes

1. Glucose with/without sodium chloride	sterile sol	ก
2. Potassium chloride	elixir, compressed tab, EC tab, sterile sol	ก
3. Sodium bicarbonate	tab, sterile sol	ก

4. Sodium chloride	sterile sol	ก
5. Sodium lactate intravenous infusion compound (Ringer-Lactate solution for injection)	sterile sol	ก
6. Water for injection	sterile sol	ก
7. Calcium polystyrene sulfonate	oral pwdr	ข

9.3 Vitamins

1. Folic acid	cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก
2. Multivitamins	syr	ก

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A 1,300 - 2,000 IU - Vitamin B6 ≥ 0.5 mg
- Vitamin D 200 - 1,000 IU - Vitamin B12 ≥ 0.5 mcg
- Vitamin B1 ≥ 0.3 mg - Niacinamide ≥ 4 mg
- Vitamin B2 ≥ 0.4 mg - Vitamin C ≥ 35 mg

3. Multivitamins	cap, tab	ก

มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A 2,000 - 5,600 IU - Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg
- Vitamin D 200 - 2,000 IU - Niacinamide ≥ 12 mg
- Vitamin B1 ≥ 0.9 mg - Folic acid 300-1000 mcg
- Vitamin B2 ≥ 0.9 mg - Vitamin C ≥ 45 mg
- Vitamin B6 ≥ 1.0 mg

4. Vitamin C	tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ก
5. Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	ก
6.Vitamin B complex	cap, tab	ก

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

Vitamin B1 ≥ 0.9 mg	Folic acid 300-1,000 mcg
Vitamin B2 ≥ 0.9 mg	Niacinamide ≥ 12 mg
Vitamin B6 ≥ 1.0 mg	Pantothenic acid ≥ 4 mg
Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg	Biotin ≥ 20 mcg

7. Vitamins B complex	sterile sol	ข
ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อย 4 ชนิด ที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี		
Vitamin B1 ≥ 0.9 mg Vitamin B6 ≥ 1.0 mg		
Vitamin B2 ≥ 0.9 mg Niacinamide ≥ 12 mg		
8.Vitamin D2 (Ergocalciferol)	cap	ก
9.Vitamin A 25,000 IU	Cap	ก
10.Calcitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D3)	Cap	ง

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (primary hypoparathyroidism)
2. ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (ชนิดเฉียบพลันรุนแรง)
3. ใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism

9.4 Intravenous nutrition

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

9.5 Minerals

1. Calcium carbonate	cap, tab	ก
2. Calcium gluconate	sterile sol	ก
3. Magnesium sulfate	sterile sol, oral sol, oral sol(hosp)	ก
4. Ferrous fumarate	cap, tab, oral sol, susp	ข
5.Oral neutral phosphate solution (Joulie's solution) มีตัวยาสำคัญ คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/dibasic	oral sol (hosp)	ค

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

1. Ferrous fumarate	tab (เฉพาะ 65 mg as iron)	ก
2. Folic acid	cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก
3. Ferrous salt + Folic acid + Potassium Iodide	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine	ก

9.7 Metabolic disorders

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

1. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	tab, EC tab	ก
2. Ibuprofen	film coated tab, susp	ก
3. Naproxen	compressed tab (as base)	ก
4. Diclofenac Sodium	Sterile sol.	ก

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

1. Chloroquine phosphate	compressed tab, film coated tab	ข

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

1. Colchicine	tab	ก
1. Allopurinol	tab	ก

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

1. Diazepam	cap, tab, sterile sol	ก

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation

10.3.1 Rubifacients

1. Methyl salicylate ointment compound (Analgesic Balm)	oint	ก

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

กลุ่มยา 11 Eye

11.1 Anti-infective eye preparations

11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

1. Boric acid	eye wash sol	ก
2. Chloramphenicol	eye oint	ก
3. Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin	eye drop	ค

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

11.1.3 Antifungals

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

11.1.4 Antivirals

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

1. Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ก

11.3 Mydriatics and cycloplegics

1. Atropine sulfate	eye drop	ค

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

11.5 Local anaesthetics

1. Tetracaine hydrochloride	eye drop	ก

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

1. Hypromellose (with preservative)	eye drop	ก

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa and otitis media

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

12.1.2 Drugs used in otomycosis

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

12.1.3 Other drugs acting on the ear

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

1.Fluticasone furoate	nasal spray	ค

เงื่อนไข

ใช้กับผู้ป่วยอายุ 2 ปีขึ้นไปในข้อบ่งใช้

1. โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดตามฤดูกาลและตลอดปี
2. เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

12.2.2 Topical nasal decongestants

1. Sodium chloride	sterile sol (for irrigation) (เฉพาะ 0.9%)	ก

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

1. Borax (in glycerin)	sol	ก
2. Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol (เฉพาะ 0.12- 0.2% w/v)	ก
3. Triamcinolone acetonide	oral paste	ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

1.Clotrimazole	Lozenge	ก

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

1. Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol (เฉพาะ 0.1-0.2%w/v)	ก

12.3.5 Other dental preparations

1. Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก
2. Sodium chloride	sterile sol	ก

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

13.1.1 Antibacterial preparations

1. Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	cream	ก

13.1.2 Antifungal preparations

1. Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield's ointment)	oint, oint (hosp) ก	ก
2. Clotrimazole	cream	ก

13.1.3 Parasiticidal preparations

1. Benzyl benzoate	emulsion/lotion (เฉพาะ 25%)	ก

13.2 Emollient and barrier preparations

1. Olive oil	oil	ก
2. White petrolatum	oint (hosp)	ก

13.3 Topical antipruritics

1. Calamine	lotion, lotion (hosp)	ก

13.4 Topical corticosteroids

1. Triamcinolone acetonide	cream, lotion	ก

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

13.6 Preparations for warts and calluses

1. Podophyllin (Podophyllum resin)	paint	ก
2. Trichloroacetic acid	sol (hosp)	ก
3. Salicylic acid	oint (hosp), paste (hosp)	ก

กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

1.BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	inj	ก
2.Diphtheria-Tetanus vaccine ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adu	inj	ก
3.Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell) (DTPw)	inj	ก
4.Hepatitis B vaccine (HB)	inj	ก
5.Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก
6.Influenza vaccine ชนิด pandemic influenza สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนดในแต่ละปี		ก
7.Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR)	inj	ก
8.Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) ชนิด bivalent และ trivi	oral sol, oral susp	ก
9.Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) inj ก		
10.Rabies vaccines ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine (HDCV)	inj	ก
11.Rubella vaccine	inj	ก
12.Tetanus vaccine (Tetanus toxoid)	inj	ก
13.Japanese encephalitis vaccine, inactivated (inactivated JE vac	inj	ก
14.Japanese encephalitis vaccine, live attenuated (Live Attenuated	inj	ก
15.Tetanus antitoxin, human Anti-tetanus immunoglobulin, human	inj	ข
16.Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์	inj	จ(1)
17.Inactivated polio vaccine (IPV) (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	inj	จ(1)
18.Human papillomavirus vaccine ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคอย่างน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18	inj	จ(1)

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับโครงการขยายการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กำหนดไว้ในโครงการของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 22 หรือ 24 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า

กลุ่มยา 15 Anaesthesia

15.1 General anaesthesia

15.1.1 Intravenous anaesthetics

15.1.2 Inhalational anaesthetics

15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs

1.Diazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab, sterile sol ก	ก
2.Morphine sulfate ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
3.Pethidine hydrochloride ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
4.Midazolam hydrochloride วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	sterile sol	ง

15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia

1.Atropine sulfate	sterile sol	ก

15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

15.2 Local anaesthesia

1. Lidocaine hydrochloride	gel, oint, spray, sterile sol, sterile sol (dental cart	ก
2. Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	sterile sol , sterile sol (dental cartridge)	ก

กลุ่มยา 16 Antidotes

1. Acetylcysteine (N-acetylcysteine)	sterile sol	ก
2. Antivenom sera		
3.งูเห่า		
4.งูกะปะ		

5.Atropine sulfate	sterile sol	ก
6.Calcium gluconate	sterile sol	ก
7.Charcoal, activated	pwdr	ก
8.Diazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	sterile sol	ก
9.Naloxone hydrochloride	sterile sol	ก
10.Sodium bicarbonate	sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq)	ก
11.Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	ก
12.Sodium nitrite ยากำพร้า	sterile sol , sterile sol (hosp)	ค
13.Sodium thiosulfate ยากำพร้า	sterile sol , sterile sol (hosp)	ค
14.Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ง

กลุ่มยา 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

รายการยาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

1. Favipiravir — tab (เฉพาะ 200 mg)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับทารกและเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการ ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่นได้

2.Remdesivir — sterile pwdr, sterile sol

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 28 วันขึ้นไปและมีน้ำหนักอย่างน้อย 3 กิโลกรัม ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระดับรุนแรง
2. ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
3. ใช้สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
4. ใช้สำหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

หมายเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมสำคัญสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ได้แก่

1. โรคอ้วน (น้ำหนักเทียบกับความสูง (weight for height) มากกว่า +3 standard deviations (SD))
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคไตวายเรื้อรัง
6. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
7. โรคเบาหวาน
8. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและเด็กที่มีพัฒนาการช้า

3.Molnupiravir cap (เฉพาะ 200 mg)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต เฉพาะกรณีที่ใช้ยา nirmatrelvir + ritonavir และ remdesivir ไม่ได้

บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

กลุ่มที่ 1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต

1.1 กลุ่มยาแก้ลมกองละเอียด

1.ยาหอมเทพจิตร	ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาหอมนวโกฐ	ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร

2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

1.ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาขมิ้นชัน	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยาขิง	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
4.ยาธาตุบรรจบ	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
5.ยาธาตุอบเชย	ยาน้ำ	รายการยาพื้นฐาน

2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

1.ยาธรณีสันฑะฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
2.ยามะขามแขก	ยาแคปซูล ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน

2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

1.ยาธาตุบรรจบ	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน

2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก

1.ยาผสมเพชรสังฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน

2.5 กลุ่มยารักษาโรคในกระเพาะอาหาร

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

2.6 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

1. ยาขิง	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
1.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มีdelta-9-tetrahydrocannabinol (THC ยาหยอด		รายการยาเฉพาะ

จำนวน 2 ความแรง ได้แก่ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/หยด และไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/หยด

กลุ่มที่ 3 ยารักษากลุ่มอาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

1. ยาประสะไพล	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ

กลุ่มที่ 4 ยารักษากลุ่มอาการไข้

4.1 กลุ่มยาแก้ไข้ / แก้ร้อนใน

บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570		
1.ยาจันทน์ลีลา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
2.ยามะระขี้นก	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยารางจืด	ยาชง	รายการยาพื้นฐาน
กลุ่มที่ 5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ		
5.1 กลุ่มยาบรรเทาอาการไอ / เสมหะ		
1.ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	ยาน้ำ	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาตรีผลา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยาประสะมะแว้ง	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
5.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด		
1.ยาปราบชมพูทวีป	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
กลุ่มที่ 6 ยาบำรุงโลหิต		
**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง		
กลุ่มที่ 7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก		
1.ยาเถาวัลย์เปรียง	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาแก้ลมแก้เส้น	ยาผง	รายการยาเฉพาะ
3.ยาไพล	ครีม	รายการยาพื้นฐาน
4.ยาทำลายพระสุเมรุ	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
5.ยาธรณีสันฑะฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
6.ยาประคบ	ยาประคบสมุนไพรสด	รายการยาพื้นฐาน
7.ยาสหัศธารา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
กลุ่มที่ 8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ		
1.ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน
กลุ่มที่ 9 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง		
1. ยาพญายอ	ยาครีม ยาโลชั่น	รายการยาพื้นฐาน
กลุ่มที่ 10 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ		
**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง		
กลุ่มที่ 11 ยาถอนพิษเบื่อเมา		
1.ยารางจืด	ยาชง	รายการยาพื้นฐาน

บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบ 2570

กลุ่มที่ 12 ยาลดความอยากบุหรี่

1.ยาหญ้าดอกขาว	ยาชง	รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 13 ยารักษากลุ่มโรคที่เกี่ยวกับกษัย

1.ยาธรณีสันฑะฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ

กลุ่มที่ 14 ยารักษากลุ่มอาการสมองและระบบประสาท

1.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มีcannabidiol (CBD) 100 มิลลิกรัม/มิลล	ยาหยอดในช่องปาก/เยื่อบุในช่องปาก	
และมี delta-9-tetrahydrocannabinol(THC) ในอัตราส่วนที่ CBD:		รายการยาพิเศษ
มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1		

กลุ่มที่ 15 ยารักษากลุ่มอาการอื่น ๆ

1.น้ำมันกัญชาทั้งห้า	ยาหยอดในช่องปาก/เยื่อบุในช่องปาก	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยาศุขไสยาศน์	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ

ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

1.ยาพอกเข่า	ยาพอก
2.ยาบำรุงน้ำนม	ยาต้ม
3.ยามธุระเมหะ	ยาต้ม
4.ยาหม่องเสลดพังพอน	ยาหม่อง