แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Ciprofloxacin 500 mg

ผู้ป่วยชื่อ_____อายุ_____

HN_____ วันที่สั่งจ่าย_____

ข้อบ่งใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งใช้ทุกครั้ง)

☐ Acute uncomplicated pyelonephritis

☐ Bone/Joint infection

☐ Disseminated gonococcal infection

☐ Severe/Complicated UTI

☐ สั่งใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อต่อยารับประทานชนิดอื่นและแพ้ยากลุ่มพื้นฐาน (penicillin, macrolide)

☐ สั่งใช้ในกรณีที่มีเหตุผลให้คิดว่าติดเชื้อ P.aeruginosa ที่ไม่รุนแรงและจะใช้ยารับประทาน ในการรักษา

☐ สั่งใช้ในกรณีติดเชื้อที่ sensitive ต่อยา Ciprofloxacin

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา

- ผู้ใหญ่ : ขนาดยา 500-750 mg วันละ 2 ครั้ง
- เด็ก (≥4 weeks to 18 years; usual dose) : ขนาดยา 10-15 mg/kg/dose (to a maximum 500 mg) given 12 hourly

ขนาดยาของผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

	CrCl > 50	**CrCl 30-50**	**CrCl < 30**
General infection	500 mg PO q 12 hr	same	500 mg PO q 24 hr
Pseudomonas, severe	750 mg PO q 12 hr	500 mg PO q 12 hr	500 mg PO q 24 hr

HD 250-500 mg PO q 24 hr (Dose daily, but after HD on HD days)

CRRT 500 mg PO q 12 hr

Drug interaction : เมื่อให้ร่วมกับ Theophylline อาจทำให้เพิ่มพิษของ Theophylline

แพทย์ผู้สั่งใช้ .....

การประเมินผล (เภสัชกร)

☐ **ตามเกณฑ์** ☐ **ไม่ตามเกณฑ์**

1 เม.ย 2569