

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Seretide® Accuhaler 50/250

(Salmeterol 50 mcg + Fluticasone 250 mcg)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____
HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้(ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- ☐ ผู้ป่วย Asthma ที่ใช้ยา Budesonide MDI ขนาดปานกลาง (2 puff bid) และ SeroFlo®(25/125) ขนาดปานกลาง (2 puff bid) แล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้
- ☐ ผู้ป่วย COPD ที่ใช้ยา SeroFlo® (25/125) ขนาดปานกลาง (2 puff bid) แล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้และมีประวัติ > 2 moderate Exacerbation หรือ > 1 hospitalization ร่วมกับมี mMRC > 2, CAT > 10
- ☐ รับยาต่อเนื่องมาจากที่อื่น (refer back)

ประกอบด้วย

1. Salmeterol xinafoate (Long acting β_2 -agonist : LABA) 50 mcg (pregnancy category : C)
2. Fluticasone propionate (Inhaled corticosteroid : ICS) 250 mcg (pregnancy category : C)

ขนาดบรรจุ บรรจุขวดละ 60 doses

วิธีการบริหาร : สูดเข้าทางปาก

Asthma ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

- สูดยาครั้งละ 1 สูด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

COPD ขนาดยาในผู้ใหญ่

- สูดยาครั้งละ 1 สูด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ข้อควรระวัง

1. ไม่สามารถใช้บรรเทาอาการ Exacerbation ได้
2. ควรระวังเมื่อให้ในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคที่ปอด (pulmonary tuberculosis)
3. อาจทำให้ Serum potassium ลดลงชั่วคราวได้ถ้าใช้ในขนาดที่สูง

อาการไม่พึงประสงค์ : เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เสียงแหบ ติดเชื้อราในช่องปาก

ปฏิกิริยาระหว่างยา :

- Ritonavir จะทำให้ปริมาณ Fluticasone ในเลือดเพิ่มขึ้น
- Ketoconazole และ Itraconazole จะทำให้ปริมาณ Fluticasone ในเลือดเพิ่มขึ้น

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

- ☐ ตามเกณฑ์ ☐ ไม่ตามเกณฑ์