

แบบประเมินการใช้ยาที่เหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Spiriva® Handihaler

(Tiotropium 18 mcg)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- ผู้ป่วย COPD ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และไม่สามารถควบคุมอาการเหนื่อยหอบด้วยยาขยายหลอดลมทั้งยาพ่นและ/หรือยากินที่มีทั้งหมดในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 เดือน
- ☐ ผู้ป่วย (Gold C) ที่มีอาการเหนื่อยหอบมาก mMRC 0-1, CAT < 10 และมีข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
 - ☐ 1.1 มีอาการหอบเหนื่อยกำเริบเฉียบพลัน (Exacerbation) ≥ 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 - ☐ 1.2 มีอาการหอบเหนื่อยกำเริบเฉียบพลันจนต้องนอนโรงพยาบาล (Hospitalization) ≥ 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- ☐ ผู้ป่วย (Gold D) ที่มีอาการเหนื่อยหอบมาก mMRC ≥ 2 , CAT ≥ 10 และมีข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
 - ☐ 1.2 มีอาการหอบเหนื่อยกำเริบเฉียบพลัน (Exacerbation) ≥ 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 - ☐ 1.3 มีอาการหอบเหนื่อยกำเริบเฉียบพลันจนต้องนอนโรงพยาบาล (Hospitalization) ≥ 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- ☐ รับยาต่อเนื่องมาจากที่อื่น (refer back)

ประกอบด้วย

Tiotropium (long-acting muscarinic antagonist : LAMA) 18 mcg (pregnancy category : C)

ขนาดบรรจุ แคปซูลสำหรับสูด 30 แคปซูล แชนด์ลีเฮลเลอร์ 1 เครื่อง

วิธีการบริหาร : สูดเข้าทางปาก

สูดยาครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้ยานี้รักษากรณีที่เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคต่อหิมนชนิดมูมแคบ ต่อมลูกหมากโต และท่อปัสสาวะอุดตัน
- ในผู้ป่วยที่มี CrCl <60 ฝ้าระวังอาการ Anticholinergic effect

อาการไม่พึงประสงค์ : เช่น ปากแห้ง ท้องผูก แสบคอ ใจสั่น ปัสสาวะลำบากและปัสสาวะขัด

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล(เภสัชกร)

- ☐ ตามเกณฑ์ ☐ ไม่ตามเกณฑ์