แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Ticagrelor 90 mg

ผู้ป่วยชื่อ_____ **อายุ** _____

HN_____ **วันที่สั่งจ่าย** _____

ข้อบ่งชี้ใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งใช้ทุกครั้ง)

☐ Case STEMI ที่ต้อง refer ไปทำ PCI ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยผ่านการปรึกษาจากแพทย์ Cardio เท่านั้น

จัดอยู่ในกลุ่มยา : $P2Y_{12}$ receptor inhibitors

กลไกการออกฤทธิ์ :

จับกับ $P2Y_{12}$ receptor บนเกล็ดเลือดแล้วยับยั้งไม่ให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มรวมตัวกัน จึงลดการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วย acute coronary syndromes ได้

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา : 2 เม็ด ทันที

อาการไม่พึงประสงค์จากยา :

- เพิ่มความเสี่ยง bleeding event มากกว่า Clopidogrel

Drug interaction :

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ Strong CYP3A inducers หรือ inhibitors เช่น Rifampin และ Ketonazole
- การใช้ Ticagrelor ร่วมกับ Simvastatin มีผลทำให้ระดับ Simvastatin เพิ่มสูงขึ้นจนก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ส่งผลทำให้ระดับ Atorvastatin สูงขึ้นเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

☐ ตามเกณฑ์ ☐ ไม่ตามเกณฑ์